

Le programme de première année TSI est organisé en trois parties. Dans une première partie figurent les notions et les objets qui doivent être étudiés dès le début de l'année scolaire. Il s'agit essentiellement, en partant du programme des classes de Terminale STI ou STL et en s'appuyant sur les connaissances préalables des étudiants, de donner les bases mathématiques utiles aux autres disciplines scientifiques (physique, chimie, sciences industrielles). Ces objets seront considérés comme définitivement acquis et il n'y aura pas lieu de reprendre ensuite leur étude dans le cours de mathématiques.

Les deuxième et troisième parties correspondent à un découpage classique entre l'analyse et ses applications géométriques d'une part, l'algèbre d'autre part.

## PROGRAMME DE DÉBUT D'ANNÉE

### I. NOMBRES COMPLEXES ET GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE

#### 1- Nombres complexes

L'objectif est de consolider et d'approfondir les notions sur les nombres complexes déjà abordées en classe de Terminale. Le programme combine l'étude du corps des nombres complexes et de l'exponentielle complexe avec les applications des nombres complexes aux équations algébriques, à la trigonométrie et à la géométrie.

Il est souvent commode d'identifier  $\mathbf{C}$  au plan euclidien notamment pour les problèmes d'origine géométrique, ce qui permet d'exploiter le langage de la géométrie pour l'étude des nombres complexes et, inversement, d'utiliser les nombres complexes pour traiter certaines questions de géométrie plane. En particulier, les étudiants doivent savoir interpréter à l'aide des nombres complexes les notions suivantes de la géométrie euclidienne plane : calcul vectoriel, barycentre, alignement, orthogonalité distance, mesure d'angle.

#### a) Corps $\mathbf{C}$ des nombres complexes

Corps  $\mathbf{C}$  des nombres complexes. Parties réelle et imaginaire d'un nombre complexe, conjugaison dans  $\mathbf{C}$ .

La construction du corps  $\mathbf{C}$  n'est pas exigible des étudiants.

Notations  $\operatorname{Re} z$ ,  $\operatorname{Im} z$ ,  $\bar{z}$ .

Le plan étant muni d'un repère orthonormal, affixe d'un point, d'un vecteur ; image d'un nombre complexe.

Interprétation géométrique des transformations  $z \mapsto \bar{z}$ ,  $z \mapsto z + b$ .

Module d'un nombre complexe, module d'un produit, d'un quotient. Inégalité triangulaire ; interprétation en termes de distances.

Notation  $|z|$  ; relation  $|z|^2 = \bar{z}z$ .

Interprétation géométrique de  $|z|$ , de  $|z - a|$  ; disque ouvert (fermé) de centre  $a$ .

#### b) Groupe $\mathbf{U}$ des nombres complexes de module 1

Définition du groupe  $\mathbf{U}$  des nombres complexes de module 1

Par définition,  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  où  $\theta \in \mathbf{R}$ . La dérivabilité et les variations des fonctions cosinus, sinus et tangente sont supposées connues, ainsi que leurs formules d'addition.

Définition de  $e^{i\theta}$ , relations d'Euler.

Propriétés de l'application  $\theta \mapsto e^{i\theta}$  de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{U}$ . Formule de Moivre.

Linéarisation et factorisation d'expressions trigonométriques.

Les étudiants doivent connaître les formules donnant  $\cos(a+b)$ ,  $\sin(a+b)$ ,  $\tan(a+b)$ ,  $\cos 2x$ ,  $\sin 2x$ ,  $\tan 2x$ . Ils doivent savoir exprimer  $\sin \theta$ ,  $\cos \theta$ ,  $\tan \theta$  et  $e^{i\theta}$  à l'aide de  $\tan \frac{\theta}{2}$  et relier ces formules à la représentation paramétrique rationnelle du cercle trigonométrique privé de  $-1$ .

Arguments d'un nombre complexe. Écriture d'un nombre complexe  $z \neq 0$  sous la forme  $\rho e^{i\theta}$  où  $\rho > 0$  et  $\theta \in \mathbf{R}$  (forme trigonométrique).

Racines  $n$ -ièmes de l'unité. Résolution de l'équation  $z^n = a$ .

### c) Équations du second degré

Résolution des équations du second degré à coefficients complexes ; discriminant.

### d) Exponentielle complexe

Définition de l'exponentielle d'un nombre complexe :

$$e^z = e^x e^{iy} \quad \text{où } z = x + iy.$$

Propriétés.

La dérivabilité et les variations de la fonction exponentielle réelle sont supposées connues, ainsi que son équation fonctionnelle.

### e) Nombres complexes et géométrie plane

Interprétation des transformations :

$$z \mapsto az, \quad z \mapsto az + b, \quad z \mapsto \frac{1}{z}, \quad z \mapsto \bar{z}.$$

Interprétation du module et de l'argument de  $\frac{z-a}{z-b}$ .

Les étudiants doivent savoir interpréter à l'aide des nombres complexes les notions suivantes de la géométrie euclidienne plane : distance, mesure d'angle, barycentre, alignement, orthogonalité.

## 2- Géométrie élémentaire du plan

À l'issue de la Terminale, les étudiants connaissent le plan géométrique euclidien en tant qu'ensemble de points. Ils connaissent en particulier la façon d'associer à deux points  $A$  et  $B$  le vecteur  $\overrightarrow{AB}$ , ainsi que les propriétés opératoires usuelles. Il convient de faire constater que l'ensemble des vecteurs du plan est muni d'une structure de plan vectoriel (réel), défini comme espace vectoriel sur  $\mathbf{R}$  dont tout vecteur s'exprime comme combinaison linéaire de deux vecteurs indépendants, c'est-à-dire non colinéaires. Toute théorie générale des espaces vectoriels est exclue à ce stade.

Dans le plan, les notions suivantes sont supposées connues : calcul vectoriel, distance euclidienne, orthogonalité, repère orthonormal, angles.

La donnée d'un repère orthonormal identifie le plan à  $\mathbf{R}^2$  ou à  $\mathbf{C}$ .

### a) Modes de repérage dans le plan

Repère cartésien du plan, coordonnées cartésiennes.

Repère orthonormal direct, changement de repère.

Les formules de changement de repère sont à connaître, uniquement dans le cas où les deux repères sont orthonormaux directs.

Coordonnées polaires d'un point du plan supposé muni d'un repère orthonormal.

Équation polaire d'une droite, d'un cercle passant par  $O$ .

Le repère orthonormal identifie le plan à  $\mathbf{C}$ .

Repère polaire  $(\vec{u}, \vec{v})$  du plan euclidien  $\mathbf{R}^2$  défini, pour tout nombre réel  $\theta$ , par :

$$\vec{u}(\theta) = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2,$$

$$\vec{v}(\theta) = -\sin \theta \vec{e}_1 + \cos \theta \vec{e}_2$$

où  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$  est la base canonique de  $\mathbf{R}^2$ .

Identification  $\vec{u} = e^{i\theta}$ ,  $\vec{v} = ie^{i\theta}$ .

### b) Produit scalaire

Définition géométrique du produit scalaire. Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont non nuls

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}),$$

et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$  sinon.

Interprétation en terme de projection.

Bilinéarité, symétrie, expression en base orthonormale.

Dans  $\mathbf{C}$ , interprétation géométrique de  $\operatorname{Re}(\bar{a}b)$ .

Définition d'une isométrie du plan, d'un déplacement ; exemples : translation, rotation, réflexion. Image par une isométrie des figures et des configurations usuelles.

La classification générale des isométries du plan est hors programme.

Expression analytique de l'image d'un vecteur par une rotation d'angle  $\theta$ .

Au moment de l'étude des matrices on donnera la matrice d'une rotation vectorielle.

### c) Déterminant

Définition géométrique du déterminant. Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont non nuls

$$\text{Det}(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}),$$

et  $\text{Det}(\vec{u}, \vec{v}) = 0$  sinon.

Bilinéarité, antisymétrie, expression en base orthonormale directe.

La notion d'orientation du plan est admise, ainsi que celle de base orthonormale directe.

Dans  $\mathbf{C}$ , interprétation de  $\text{Im}(\bar{a}b)$  comme déterminant des vecteurs associés à  $a$  et  $b$ . Interprétation géométrique de  $|\text{Det}(\vec{u}, \vec{v})|$  comme aire du parallélogramme construit sur  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .

### d) Droites

Applications du déterminant à la colinéarité de deux vecteurs, l'alignement de trois points.

Lignes de niveau de  $M \mapsto \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM}$  et de  $M \mapsto \text{Det}(\vec{u}, \overrightarrow{AM})$ . Paramétrage et équation cartésienne d'une droite définie par un point et un vecteur directeur, par deux points distincts, par un point et un vecteur normal.

Intersection de deux droites.

Distance à une droite, équation normale d'une droite.

### e) Cercles

Équation cartésienne d'un cercle. Intersection d'un cercle et d'une droite.

Caractérisation d'un cercle de diamètre  $[AB]$  par l'équation  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ .

### f) Similitudes directes du plan

Définition d'une similitude (transformation affine multipliant les distances dans un rapport donné) ; rapport de similitude. Définition d'une similitude directe. Homothéties de rapport non nul, translations, rotations. Composée de deux similitudes.

Écriture complexe d'une similitude directe. Centre et mesure de l'angle d'une similitude directe distincte d'une translation.

L'étude générale des similitudes du plan est hors programme.

Les étudiants doivent connaître l'effet d'une similitude directe sur les angles orientés et les aires.

## 3- Géométrie élémentaire de l'espace

À l'issue de la Terminale, les étudiants connaissent l'espace géométrique euclidien (de dimension 3) en tant qu'ensemble de points. Ils connaissent en particulier la façon d'associer à deux points  $A$  et  $B$  le vecteur  $\overrightarrow{AB}$ , ainsi que les propriétés opératoires usuelles. Il convient de faire constater que l'ensemble des vecteurs de l'espace est muni d'une structure d'espace vectoriel (réel) de dimension 3, défini comme espace vectoriel sur  $\mathbf{R}$  dont tout vecteur s'exprime comme combinaison linéaire de trois vecteurs indépendants. Toute théorie générale des espaces vectoriels est exclue à ce stade.

Dans l'espace, les notions suivantes sont supposées connues : calcul vectoriel, distance euclidienne, orthogonalité, repère orthonormal, angles.

La donnée d'un repère orthonormal identifie l'espace à  $\mathbf{R}^3$ .

### a) Modes de repérage dans l'espace

Coordonnées cartésiennes, cylindriques, sphériques.

Pour les coordonnées sphériques, on convient de noter  $\theta$  la colatitude, mesure dans  $[0, \pi]$  de l'angle entre  $Oz$  et  $OM$ .

### b) Produit scalaire

Définition géométrique du produit scalaire. Bilinéarité, symétrie, expression en base orthonormale.

Expression de la distance de deux points dans un repère orthonormal.

### c) Produit vectoriel

Définition géométrique du produit vectoriel de deux vecteurs. Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont non nuls, le produit vectoriel de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le vecteur de norme  $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$  directement orthogonal à  $(\vec{u}, \vec{v})$ ; sinon le produit vectoriel est le vecteur nul. Notations  $\vec{u} \wedge \vec{v}$  ou  $\vec{u} \times \vec{v}$ .

Bilinéarité, antisymétrie. Expression dans un repère orthonormal direct. Condition de colinéarité de deux vecteurs.

Isométries de l'espace, déplacements; exemples: translations, réflexions, rotations.

### d) Déterminant ou produit mixte

Définition du produit mixte (ou déterminant) de trois vecteurs:

$$\text{Det}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

Trilinéarité, antisymétrie. Expression en repère orthonormal direct. Condition pour que trois vecteurs soient coplanaires.

### e) Droites et plans

Paramétrage d'une droite définie par un point et un vecteur directeur, deux points distincts, deux plans sécants.

Équation d'un plan défini par un point et deux vecteurs indépendants, un point et un vecteur normal, trois points non alignés. Équation normale d'un plan; distance à un plan.

Intersections de droites et de plans.

Distance d'un point à une droite.

Distance de deux droites; perpendiculaire commune.

### f) Sphères

Équation cartésienne d'une sphère en repère orthonormal.

Intersection d'une sphère et d'une droite, d'une sphère et d'un plan.

La notion d'orientation de l'espace est admise, ainsi que celle de base orthonormale directe. Il convient de donner les conventions physiques usuelles.

Interprétation de  $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$  comme aire du parallélogramme construit sur  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .

L'application  $\vec{v} \mapsto \vec{u} \times \vec{v}$  est linéaire comme composée de trois applications linéaires (projection, rotation d'angle droit, homothétie).

La classification des isométries, ainsi que celle des déplacements de l'espace sont hors programme.

Interprétation de  $|\text{Det}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$  comme volume du parallélépipède construit sur  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$ .

## II. FONCTIONS USUELLES ET ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

*Les propriétés élémentaires liées à la dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle sont supposées connues. Les dérivées des fonctions circulaires réciproques seront déterminées en admettant le théorème sur la dérivabilité d'une fonction réciproque.*

### 1- Fonctions usuelles

*Les propriétés des fonctions polynomiales et rationnelles et des fonctions exp, (sur  $\mathbf{R}$ ), ln, cos, sin sont rappelées sans démonstration.*

#### a) Fonctions exponentielles, logarithmes, puissances

Fonctions exponentielles réelles, fonctions logarithmes. Fonctions puissances. Croissances comparées de ces fonctions.

Fonctions hyperboliques ch, sh et th et fonctions hyperboliques réciproques Arg ch, Arg sh et Arg th.

Les étudiants doivent savoir dériver une fonction de la forme  $x \mapsto u(x)^{v(x)}$ .

En ce qui concerne la trigonométrie hyperbolique, la seule formule exigible des étudiants est la relation  $\text{ch}^2 t - \text{sh}^2 t = 1$  et son interprétation géométrique.

Dérivées, variations et représentations graphiques des fonctions hyperboliques directes et réciproques.

Tout autre connaissance, en particulier l'expression des fonctions hyperboliques réciproques à l'aide d'un logarithme, est non exigible.

## b) Fonctions circulaires

Fonctions circulaires cos, sin et tan.

Fonctions circulaires réciproques Arc sin, Arc cos, Arc tan.

Les étudiants doivent connaître les dérivées, les variations et les représentations graphiques des fonctions circulaires directes et réciproques.

## c) Fonction exponentielle complexe

Dérivation de  $t \mapsto e^{at}$  où  $a \in \mathbf{C}$ ; dérivation de  $t \mapsto e^{\varphi(t)}$ , où  $\varphi$  est à valeurs complexes.

La dérivée d'une fonction à valeurs complexes est définie par dérivation des parties réelle et imaginaire.

## 2- Équations différentielles linéaires

*Il convient ici de rappeler la notion de primitive et d'admettre le théorème fondamental la reliant à la notion d'intégrale. Toute théorie générale de l'intégration est exclue à ce stade.*

*L'objectif, très modeste, est d'étudier les équations différentielles linéaires du premier ordre et les équations linéaires du second ordre à coefficients constants.*

*Il convient de relier cette étude à l'enseignement des autres disciplines scientifiques (systèmes mécaniques ou électriques gouvernés par une loi d'évolution et une condition initiale, traitement du signal). Il convient d'étudier le comportement du signal de sortie associé à différents types de signaux d'entrée (échelon unité, créneau, exponentielle réelle ou circulaire) et de dégager la signification de certains paramètres ou comportements : stabilité, régime permanent, oscillation, amortissement, fréquences propres, résonance. Dans le cadre de tels problèmes, on peut être amené à étendre la notion de solution (fonction  $\mathcal{C}^1$  ou  $\mathcal{C}^2$  par morceaux) mais, en mathématiques, aucune connaissance sur ce point n'est exigible des étudiants.*

### a) Équations linéaires du premier ordre

Caractérisation de la fonction  $t \mapsto e^{at}$  ( $a \in \mathbf{C}$ ) par l'équation différentielle  $y' = ay$  et la condition initiale  $y(0) = 1$ .

Équation  $y' + a(t)y = b(t)$ , où  $a, b, c$  sont des fonctions continues à valeurs réelles ou complexes. Équation sans second membre associée.

Existence et unicité de la solution satisfaisant à une condition initiale donnée. Droite vectorielle des solutions de l'équation sans second membre associée. Expression des solutions sous forme intégrale.

Équation fonctionnelle  $f(t+u) = f(t)f(u)$  où  $f$  est une fonction dérivable de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{C}$ .

Conséquences de la linéarité de l'équation : structure de l'ensemble des solutions ; la solution générale de l'équation avec second membre est somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation sans second membre ; principe de superposition lorsque  $b = b_1 + b_2$ .

### b) Équations linéaires du second ordre à coefficients constants

Équation  $ay'' + by' + cy = f(t)$ , où  $a, b, c$  sont des nombres complexes,  $a \neq 0$ , et  $f$  une somme de fonctions de type  $t \mapsto e^{\alpha t}P(t)$ , où  $\alpha \in \mathbf{C}$  et  $P \in \mathbf{C}[X]$ .

Équation sans second membre associée.

Existence et unicité de la solution satisfaisant à une condition initiale donnée. Plan vectoriel des solutions de l'équation sans second membre associée.

Conséquences de la linéarité de l'équation : structure de l'ensemble des solutions ; la solution générale de l'équation avec second membre est somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation sans second membre ; principe de superposition lorsque  $f = f_1 + f_2$ .

### 3- Courbes paramétrées. Coniques

On adopte ici le point de vue suivant. Par définition, la fonction vectorielle  $f$  tend vers le vecteur  $l$  si  $\|f - l\|$  tend vers zéro ; cela équivaut au fait que les fonctions coordonnées de  $f$  tendent vers les coordonnées de  $l$ .

#### a) Courbes planes paramétrées

Dérivation de  $(f|g)$ ,  $\|f\|$ ,  $\text{Det}(f, g)$  lorsque  $f$  et  $g$  sont deux fonctions  $\mathcal{C}^1$  à valeurs dans  $\mathbf{R}^2$ .

Courbe définie par une représentation paramétrique de classe  $\mathcal{C}^k$

$$t \mapsto \overrightarrow{OM}(t) = f(t).$$

Point régulier, tangente en un point régulier.

Interprétation cinématique : mouvement d'un point mobile, trajectoire, vitesse, accélération.

Exemples d'étude de branches infinies.

#### b) Coniques

Dans le plan, lignes de niveau de  $\frac{MF}{MH}$  ; définition par excentricité, foyer et directrice d'une parabole, d'une ellipse, d'une hyperbole. Équations réduites, centres, sommets, foyers. Asymptotes d'une hyperbole.

Détermination, en coordonnées cartésiennes, des tangentes à une conique.

Image d'un cercle par une affinité orthogonale.

Énoncé, sans démonstration, de la caractérisation des ellipses et des hyperboles à l'aide des lignes de niveau de  $MF + MF'$  et de  $|MF - MF'|$  (définition bifocale).

Projection orthogonale d'un cercle de l'espace sur un plan.

# ANALYSE ET GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

Le programme d'analyse est organisé autour des concepts fondamentaux de suite et de fonction. La maîtrise du calcul différentiel et intégral à une variable et de ses interventions en géométrie différentielle plane constitue un objectif essentiel.

Le cadre d'étude est bien délimité : suites de nombres réels et de nombres complexes, fonctions définies sur un intervalle de  $\mathbf{R}$  à valeurs réelles ou complexes, courbes planes, notions élémentaires sur les fonctions de deux variables réelles.

Le programme combine l'étude globale des suites et des fonctions (opérations, majorations, monotonie, existence d'extremums...) et l'étude de leur comportement local ou asymptotique. En particulier, il convient de mettre en valeur le caractère local des notions de limite, de continuité, de dérivabilité et de tangente.

Il combine aussi l'étude de problèmes qualitatifs (monotonie d'une suite ou d'une fonction, existence de limites, continuité, existence de zéros et d'extremums de fonctions, existence de tangentes...) avec celle des problèmes quantitatifs (majorations, évaluations asymptotiques de suites et de fonctions, approximations de zéros et d'extremums de fonctions, propriétés métriques des courbes planes...).

En analyse, les majorations et les encadrements jouent un rôle essentiel. Tout au long de l'année, il convient donc de dégager les méthodes usuelles d'obtention de majorations et de minoration : opérations sur les inégalités, emploi de la valeur absolue ou du module, emploi du calcul différentiel et intégral (recherche d'extremums, inégalités des accroissements finis et de la moyenne, majorations tayloriennes...). Pour comparer des nombres, des suites ou des fonctions, on utilise systématiquement des inégalités larges (qui sont compatibles avec le passage à la limite), en réservant les inégalités strictes aux cas où elles sont indispensables.

En ce qui concerne l'usage des quantificateurs, il convient d'entraîner les étudiants à savoir les employer pour formuler de façon précise certains énoncés et leurs négations (caractère borné, caractère croissant, existence d'une limite, continuité en un point, continuité sur un intervalle, dérivabilité en un point...). En revanche, il convient d'éviter tout recours systématique aux quantificateurs. A fortiori, leur emploi abusif (notamment sous forme d'abréviations) est exclu.

Le programme d'analyse et géométrie différentielle comporte la construction, l'analyse et l'emploi d'algorithmes numériques (approximations de solutions d'équations numériques, approximations d'une intégrale...) et d'algorithmes de calcul formel (dérivation, primitivation...); plus largement, le point de vue algorithmique est à prendre en compte pour l'ensemble de ce programme, notamment pour le tracé de courbes.

## I. NOMBRES RÉELS, SUITES ET FONCTIONS

### 1- Suites de nombres réels

Pour la notion de limite d'une suite  $(u_n)$  de nombres réels, on adopte les définitions suivantes :

- étant donné un nombre réel  $a$ , on dit que  $(u_n)$  admet  $a$  pour limite si, pour tout nombre réel  $\varepsilon > 0$ , il existe un entier  $N$  tel que, pour tout entier  $n$ , la relation  $n \geq N$  implique la relation  $|u_n - a| \leq \varepsilon$ . Lorsqu'un tel nombre  $a$  existe, on dit que la suite  $(u_n)$  est convergente, ou qu'elle admet une limite finie ; le nombre  $a$  est alors unique, et on le note  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ . Dans le cas contraire, on dit que  $(u_n)$  est divergente ;

- on définit de manière analogue la notion de limite lorsque  $a = +\infty$  ou  $a = -\infty$  ; on dit alors que la suite  $(u_n)$  tend vers  $+\infty$  ou vers  $-\infty$ .

Tout vocabulaire topologique est hors programme.

#### a) Corps $\mathbf{R}$ des nombres réels

Corps  $\mathbf{R}$  des nombres réels ; relation d'ordre, compatibilité avec l'addition, la multiplication.

La construction du corps des nombres réels et la notion de corps totalement ordonné sont hors programme.

Valeur absolue d'un nombre réel, distance de deux points.

Inégalités triangulaires

$$||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|.$$

Définition d'une borne supérieure, d'une borne inférieure.

Toute partie majorée non vide admet une borne supérieure. Propriété admise.

Définition de la droite réelle achevée  $\overline{\mathbf{R}}$ .

Définition des intervalles de  $\mathbf{R}$ . Tout intervalle  $]a, b[$  non vide rencontre  $\mathbf{Q}$  et son complémentaire.

Partie entière d'un nombre réel. Valeurs décimales approchées à la précision  $10^{-n}$ ; approximation par défaut, par excès.

### b) Suites de nombres réels

Ensemble des suites de nombres réels, opérations, relation d'ordre.

Suites majorées, minorées. Suites bornées.

Suites monotones, strictement monotones.

### c) Limite d'une suite

Limite d'une suite, convergence et divergence.

Lorsque  $a \in \mathbf{R}$ , la relation  $u_n \rightarrow a$  équivaut à  $u_n - a \rightarrow 0$ .

Toute suite convergente est bornée.

Espace vectoriel des suites convergent vers 0; produit d'une suite bornée et d'une suite convergent vers 0.

Opérations algébriques sur les limites; compatibilité du passage à la limite avec la relation d'ordre.

Suites extraites d'une suite. Toute suite extraite d'une suite convergent vers  $a$  converge vers  $a$ .

### d) Relations de comparaison

Étant donnée une suite  $(\alpha_n)$  de nombres réels non nuls, définition d'une suite  $(u_n)$  de nombres réels dominée par  $(\alpha_n)$ , négligeable devant  $(\alpha_n)$ .

Définition de l'équivalence de deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  de nombres réels non nuls. Équivalent d'un produit, d'un quotient.

Si  $u_n = \alpha_n + w_n$ , où  $w_n$  est négligeable devant  $\alpha_n$ , alors  $u_n \sim \alpha_n$ .

Comparaison des suites de référence :

$$n \mapsto a^n, n \mapsto n^\alpha, n \mapsto (\ln n)^\beta, n \mapsto n!$$

où  $a > 0$ ,  $\alpha \in \mathbf{R}$ ,  $\beta \in \mathbf{R}$ .

### e) Théorèmes d'existence de limites

Toute suite croissante majorée  $(u_n)$  converge, et

$$\lim_n u_n = \sup_n u_n.$$

Extension au cas d'une suite croissante non majorée.

Suites adjacentes.

### f) Brève extension aux suites complexes

Suites à valeurs complexes; parties réelle et imaginaire d'une suite; conjugaison.

Suites bornées.

La notion de développement décimal illimité est hors programme.

Pour la présentation du cours, le programme se place dans le cadre des suites indexées par  $\mathbf{N}$ . On effectue ensuite une brève extension aux autres cas usuels.

Tout nombre réel est limite d'une suite de nombres rationnels.

Toute suite de nombres réels convergeant vers un nombre réel strictement positif est minorée, à partir d'un certain rang, par un nombre réel strictement positif.

Si  $|u_n| \leq \alpha_n$  et  $\alpha_n \rightarrow 0$ , alors  $u_n \rightarrow 0$ .

Si  $v_n \leq u_n \leq w_n$ , et si  $v_n \rightarrow a$  et  $w_n \rightarrow a$ , alors  $u_n \rightarrow a$ .

Si  $v_n \leq u_n$  et si  $v_n \rightarrow +\infty$ , alors  $u_n \rightarrow +\infty$ .

Application à la divergence d'une suite bornée: il suffit d'exhiber deux suites extraites convergent vers des limites différentes.

La notion de valeur d'adhérence d'une suite est hors programme.

Notations  $u_n = O(\alpha_n)$ ,  $u_n = o(\alpha_n)$ .

Caractérisations à l'aide du quotient  $\frac{u_n}{\alpha_n}$ .

Notation  $u_n \sim v_n$ .

Caractérisation à l'aide du quotient  $\frac{u_n}{v_n}$ .

Si  $u_n \sim v_n$ , alors, à partir d'un certain rang, le signe de  $u_n$  est égal à celui de  $v_n$ .

Exemples simples de développements asymptotiques. Toute étude systématique est exclue; en particulier, la notion générale d'échelle de comparaison est hors programme.

La démonstration de ce théorème est hors programme.

Cas particulier de la dichotomie.

Notations  $\operatorname{Re} u_n$ ,  $\operatorname{Im} u_n$ ,  $\bar{u}_n$ ,  $|u_n|$ .

Limite d'une suite à valeurs complexes ; caractérisation à l'aide des parties réelle et imaginaire. Toute suite convergente est bornée.  
Opérations algébriques sur les limites.

## 2- Fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles

Pour la notion de limite d'une fonction  $f$  en un point  $a$  (appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ ), on adopte les définitions suivantes :

- Étant donné des nombres réels  $a$  et  $b$ , on dit que  $f$  admet  $b$  pour limite au point  $a$  si, pour tout nombre réel  $\varepsilon > 0$ , il existe un nombre réel  $\delta > 0$  tel que, pour tout élément  $x$  de  $I$ , la relation  $|x - a| \leq \delta$  implique la relation  $|f(x) - b| \leq \varepsilon$  ; le nombre  $b$  est alors unique, et on le note  $\lim_{x \rightarrow a} f$ . Lorsqu'un tel nombre  $b$  existe, on dit que  $f$  admet une limite finie au point  $a$ .

- On définit de manière analogue la notion de limite lorsque  $a = +\infty$  ou  $a = -\infty$ , ou lorsque  $b = +\infty$  ou  $b = -\infty$ .

Dans un souci d'unification, on dit qu'une propriété portant sur une fonction définie sur  $I$  est vraie au voisinage de  $a$  si elle est vraie sur l'intersection de  $I$  avec un intervalle ouvert de centre  $a$  lorsque  $a \in \mathbf{R}$ , avec un intervalle  $]c, +\infty[$  lorsque  $a = +\infty$  et avec un intervalle  $]-\infty, c[$  lorsque  $a = -\infty$ .

En ce qui concerne le comportement global et local (ou asymptotique) d'une fonction, il convient de combiner l'étude de problèmes qualitatifs (monotonie, existence de zéros, existence d'extremums, existence de limites, continuité, dérivabilité...) avec celle de problèmes quantitatifs (majorations, encadrements, caractère lipschitzien, comparaison aux fonctions de référence au voisinage d'un point...).

### a) Fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles

Ensemble des fonctions à valeurs réelles, opérations, relation d'ordre.

Définition de  $|f|$ ,  $\sup(f, g)$ ,  $\inf(f, g)$ .

Fonctions majorées, minorées. Fonctions bornées.

Définition d'un extremum, d'un extremum local.

Notations  $\max_{x \in I} f(x)$  et  $\max_I f$ .

Définition de la borne supérieure (inférieure) d'une fonction.

Notations  $\sup_{x \in I} f(x)$  et  $\sup_I f$ .

Fonctions monotones, strictement monotones ; composition.

Sous-espace vectoriel des fonctions paires, des fonctions impaires.

Fonctions  $T$ -périodiques, opérations.

### b) Étude locale d'une fonction

Limite d'une fonction  $f$  en un point  $a$ , continuité en un point.

Lorsque  $a \in I$ , dire que  $f$  a une limite finie en  $a$  équivaut à la continuité de  $f$  en ce point.

Lorsque  $b \in \mathbf{R}$ , la relation  $f(x) \rightarrow b$  équivaut à la relation  $f(x) - b \rightarrow 0$ .

Lorsque  $a \notin I$ ,  $f$  a une limite finie en  $a$  si et seulement si  $f$  se prolonge par continuité en ce point.

Lorsque  $a \in \mathbf{R}$ , la relation  $f(x) \rightarrow b$  lorsque  $x \rightarrow a$  équivaut à la relation  $f(a + h) \rightarrow b$  lorsque  $h \rightarrow 0$ .

Limite à gauche, limite à droite.

Les limites à gauche (ou à droite) en  $a$  sont définies par restriction de  $f$  à  $I \cap ]-\infty, a[$  (à  $I \cap ]a, +\infty[$ ).

Continuité à gauche, continuité à droite.

Toute fonction admettant une limite finie en un point est bornée au voisinage de ce point.

Toute fonction admettant une limite strictement positive en un point est minorée, au voisinage de ce point, par un nombre réel strictement positif.

Espace vectoriel des fonctions tendant vers 0 en un point  $a$  ; produit d'une fonction bornée au voisinage de  $a$  par une fonction tendant vers 0 en  $a$ .

Opérations algébriques sur les limites ; compatibilité du passage à la limite avec la relation d'ordre.

Si  $|f(x)| \leq g(x)$  et  $g(x) \rightarrow 0$ , alors  $f(x) \rightarrow 0$ .

Si  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ , et si  $g(x) \rightarrow b$  et  $h(x) \rightarrow b$ , alors  $f(x) \rightarrow b$ .

Limite d'une fonction composée. Image d'une suite convergente.

Existence d'une limite d'une fonction monotone.

### c) Relations de comparaison

Étant donné un point  $a$  (appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$ ) et une fonction  $\varphi$  à valeurs réelles et ne s'annulant pas sur  $I$  privé de  $a$ , définition d'une fonction  $f$  à valeurs réelles, dominée par  $\varphi$  (négligeable devant  $\varphi$ ) au voisinage de  $a$ .

Définition de l'équivalence au voisinage de  $a$  de deux fonctions  $f$  et  $g$  à valeurs réelles ne s'annulant pas sur  $I$  privé de  $a$ . Équivalent d'un produit, d'un quotient.

Si  $f = \varphi + h$ , où  $h$  est négligeable devant  $\varphi$ , alors  $f \sim \varphi$ .

Application à la comparaison des fonctions usuelles.

### d) Fonctions continues sur un intervalle

Ensemble  $\mathcal{C}(I)$  des fonctions continues sur  $I$  et à valeurs réelles, opérations.

Composée de deux fonctions continues.

Restriction d'une fonction continue à un intervalle  $J$  contenu dans  $I$ .

Prolongement par continuité en une extrémité de  $I$ .

Image d'un intervalle par une fonction continue. Théorème des valeurs intermédiaires. Image d'un segment par une fonction continue.

Continuité de la fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone.

### e) Brève extension aux fonctions à valeurs complexes

Fonctions à valeurs complexes ; parties réelle et imaginaire d'une fonction ; conjugaison.

Fonctions bornées.

Limite d'une fonction à valeurs complexes en un point  $a$ , continuité en  $a$  ; caractérisation à l'aide des parties réelle et imaginaire.

Opérations algébriques sur les limites.

Ensemble  $\mathcal{C}(I)$  des fonctions continues sur  $I$  à valeurs complexes.

Comparaison des bornes (supérieure ou inférieure) et des limites (à gauche ou à droite).

Notations  $f = O(\varphi)$ ,  $f = o(\varphi)$ .

Caractérisations à l'aide du quotient  $\frac{f}{\varphi}$ .

Notation  $f \sim g$ .

Caractérisation à l'aide du quotient  $\frac{f}{g}$ .

Si  $f \sim g$  alors, au voisinage de  $a$ , le signe de  $f(x)$  est égal à celui de  $g(x)$ .

Si  $f$  et  $g$  sont continues,  $|f|$ ,  $\sup(f, g)$  et  $\inf(f, g)$  le sont.

La démonstration de ces trois résultats ainsi que la notion de continuité uniforme sont hors programme.

Comparaison des représentations graphiques d'une bijection et de la bijection réciproque.

Notations  $\operatorname{Re} f$ ,  $\operatorname{Im} f$ ,  $\bar{f}$ ,  $|f|$ .

Toute fonction admettant une limite en un point est bornée au voisinage de ce point.

## II. CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL

*Le programme est organisé autour de trois axes :*

- *dérivation en un point et sur un intervalle ;*
- *intégration sur un segment des fonctions continues par morceaux, à partir de l'intégration des fonctions en escalier ;*
- *théorème fondamental reliant l'intégration et la dérivation ; exploitation de ce théorème pour le calcul différentiel et intégral, et notamment pour les formules de Taylor.*

*L'étude générale de la dérivation et de l'intégration doit être illustrée par de nombreux exemples portant sur les fonctions usuelles (vues en début d'année) et celles qui s'en déduisent.*

*Les fonctions considérées dans cette partie sont définies sur un intervalle  $I$  de  $\mathbf{R}$  contenant au moins deux points et, dans les trois premiers chapitres, sont à valeurs réelles.*

## 1- Dérivation des fonctions à valeurs réelles

### a) Dérivée en un point, fonction dérivée

Dérivabilité en un point : dérivée, dérivée à gauche, à droite.

Extremums locaux des fonctions dérivables.

Dérivabilité sur un intervalle, fonction dérivée. Opérations sur les dérivées : linéarité, produit, quotient, fonctions composées, fonctions réciproques.

Pour  $0 \leq k \leq \infty$ , ensemble  $\mathcal{C}^k(I)$  des fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$ ; opérations. Dérivée  $n$ -ième d'un produit (formule de Leibniz).

Brève extension aux fonctions à valeurs complexes

Les étudiants doivent connaître et savoir exploiter l'interprétation graphique et l'interprétation cinématique de la notion de dérivée en un point.

Notations  $f'$ ,  $Df$ ,  $\frac{df}{dx}$ .

Notations  $f^{(k)}$ ,  $D^k f$ ,  $\frac{d^k f}{dx^k}$ .

### b) Étude globale des fonctions dérivables

Théorème de Rolle, égalité des accroissements finis.

Inégalité des accroissements finis :

si  $m \leq f' \leq M$ , alors  $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$ ;

Caractérisation des fonctions constantes, monotones et strictement monotones parmi les fonctions dérivables.

Application de l'inégalité des accroissements finis à l'étude des suites définies par une relation de récurrence

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

Si  $f$  est continue sur  $[a, b]$ , de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]a, b[$  et si  $f'$  a une limite finie en  $a$ , alors  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b]$ .

Pour le théorème de Rolle, l'égalité et l'inégalité des accroissements finis, ainsi que pour la caractérisation des fonctions monotones, on suppose  $f$  continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . Le théorème de Rolle est admis.

Les étudiants doivent connaître l'interprétation graphique et cinématique de ces résultats.

Voir le chapitre 4- Approximation.

### c) Brève extension aux fonctions à valeurs complexes

Dérivabilité en un point, caractérisation à l'aide des parties réelle et imaginaire; opérations sur les fonctions dérivables. Ensemble  $\mathcal{C}^k(I)$  des fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$  à valeurs complexes, où  $0 \leq k \leq +\infty$ , opérations; dérivée  $n$ -ième d'un produit.

Caractérisation des fonctions constantes. Il convient de montrer, à l'aide d'un contre-exemple, que le théorème de Rolle ne s'étend pas.

Brève extension au cas d'une limite infinie.

## 2- Intégration sur un segment des fonctions à valeurs réelles

*Le programme se limite à l'intégration des fonctions continues par morceaux sur un segment. Les notions de fonction réglée et de fonction intégrable au sens de Riemann sont hors programme.*

### a) Fonctions continues par morceaux

Définition d'une fonction  $\varphi$  en escalier sur  $[a, b]$ , d'une subdivision de  $[a, b]$  subordonnée à  $\varphi$ . Ensemble des fonctions en escalier sur un segment.

Ensemble des fonctions continues par morceaux sur un segment; opérations.

Approximation des fonctions continues par morceaux sur un segment par des fonctions en escalier : étant donnée une fonction  $f$  continue par morceaux sur  $[a, b]$ , pour tout réel  $\varepsilon > 0$ , il existe des fonctions  $\varphi$  et  $\psi$  en escalier sur  $[a, b]$  telles que :

$$\varphi \leq f \leq \psi \quad \text{et} \quad \psi - \varphi \leq \varepsilon.$$

La démonstration de ce résultat est hors programme.

## b) Intégrale d'une fonction continue par morceaux

Intégrale d'une fonction en escalier sur un segment. Linéarité. Croissance.

Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment.

Notations  $\int_I f$ ,  $\int_{[a,b]} f$ .

Définition de  $\int_a^b f(t)dt$ , où  $a$  et  $b$  appartiennent à  $I$ .

Linéarité. Croissance ; inégalité  $|\int_I f| \leq \int_I |f|$ .

Additivité par rapport à l'intervalle d'intégration, relation de Chasles.

Invariance de l'intégrale par translation.

Valeur moyenne d'une fonction.

Inégalité de la moyenne

$$\left| \int_{[a,b]} fg \right| \leq \sup_{[a,b]} |f| \int_{[a,b]} |g|.$$

Une fonction  $f$  continue et à valeurs positives sur un segment est nulle si et seulement si son intégrale est nulle.

Approximation d'une intégrale par la méthode des rectangles, par la méthode des trapèzes.

## c) Brève extension aux fonctions à valeurs complexes

Par définition,

$$\int_I f = \int_I \operatorname{Re} f + i \int_I \operatorname{Im} f.$$

Linéarité, relation de Chasles et inégalité de la moyenne.

Pour introduire la notion d'intégrale d'une fonction à valeurs positives, il convient de s'appuyer sur la notion d'aire. Aucune difficulté théorique ne doit être soulevée sur la notion d'aire.

Toute démonstration est hors programme.

En particulier

$$\left| \int_{[a,b]} f \right| \leq (b-a) \sup_{[a,b]} |f|.$$

Toute autre formule ou égalité dite de la moyenne est hors programme.

## 3- Intégration et dérivation

Dans cette partie, les fonctions considérées sont à valeurs réelles ou complexes.

### a) Primitives et intégrale d'une fonction continue

Définition d'une primitive d'une fonction continue.

Deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante.

Théorème fondamental : étant donné une fonction  $f$  continue sur un intervalle  $I$  et un point  $a \in I$ ,

- la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est l'unique primitive de  $f$  qui s'annule en  $a$  ;

- pour toute primitive  $h$  de  $f$  sur  $I$ ,

$$\int_a^x f(t) dt = h(x) - h(a).$$

Il convient de montrer sur des exemples que cette définition ne peut être étendue sans changement au cas des fonctions continues par morceaux.

Pour toute fonction  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ ,

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt.$$

## b) Calcul des primitives

Intégration par parties pour des fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$ .

Changement de variable : étant données une fonction  $f$  continue sur  $I$  et une fonction  $\varphi$  à valeurs dans  $I$  et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[\alpha, \beta]$ ,

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(u)) \varphi'(u) du.$$

Primitives des fonctions usuelles.

## c) Formules de Taylor

Pour une fonction de classe  $\mathcal{C}^{p+1}$  sur  $I$ , formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre  $p$  en un point  $a$  de  $I$ .

Majoration du reste : inégalité de Taylor-Lagrange.

Il convient de mettre en valeur l'intérêt de changements de variable affines, notamment pour exploiter la périodicité et les symétries, ou pour se ramener, par paramétrage du segment  $[a, b]$ , au cas où l'intervalle d'intégration est  $[0, 1]$  ou  $[-1, 1]$ .

Pour les fonctions rationnelles, on se limite à des cas simples : aucune théorie de la décomposition en éléments simples n'est au programme.

Relation  $f(x) = T_p(x) + R_p(x)$ , où

$$T_p(x) = \sum_{n=0}^p \frac{(x-a)^n}{n!} D^n f(a).$$

## d) Développements limités

Développement limité à l'ordre  $n$  d'une fonction au voisinage d'un point ; opérations algébriques sur les développements limités : somme, produit ; développement limité de  $u \mapsto \frac{1}{1-u}$ , application au quotient.

Existence d'un développement limité à l'ordre  $p$  pour une fonction de classe  $\mathcal{C}^p$  : formule de Taylor-Young.

Développement limité d'une primitive, d'une dérivée (démonstrations non exigibles).

Application à l'étude des points singuliers (ou stationnaires) des courbes paramétrées planes.

Les étudiants doivent savoir déterminer sur des exemples simples le développement limité d'une fonction composée. Aucun résultat général sur ce point n'est exigible.

Les étudiants doivent connaître les développements limités des fonctions exponentielle, sinus et cosinus, sinus et cosinus hyperboliques ainsi que de la fonction

$$x \mapsto (1+x)^\alpha, \alpha \in \mathbf{R}.$$

## 4- Approximation

*Dans cette partie sont regroupées un certain nombre de méthodes débouchant sur des calculs approchés par la mise en place d'algorithmes. Aucune connaissance n'est exigible concernant les erreurs ; seul leurs ordres de grandeur doivent être connus des étudiants. À cette occasion, on pourra introduire la notion de rapidité de convergence d'une suite mais aucune connaissance n'est exigible sur ce point.*

*Les algorithmes présentés ne sont regroupés que pour la commodité de la présentation ; leur étude doit intervenir au fur et à mesure de l'avancement du programme.*

### a) Calcul approché des zéros d'une fonction

On considère ici des fonctions  $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ , où  $I$  est un intervalle de  $\mathbf{R}$ .

Méthode de dichotomie.

Utilisation de suites récurrentes (méthode d'approximations successives).

Méthode de Newton et algorithme de Newton-Raphson. Convergence dans le cas d'une fonction  $f$  de classe  $\mathcal{C}^2$  telle que  $f''$  ne s'annule pas, si la valeur initiale  $x_0$  est telle que  $f(x_0)f''(x_0) \geq 0$ .

Pratique d'un test d'arrêt.

Le théorème du point fixe de Cauchy est hors programme sous forme générale mais les étudiants doivent savoir utiliser l'inégalité des accroissements finis pour justifier une convergence.

On dégagera, sur des exemples, le caractère quadratique de la convergence.

**b) Calcul approché d'une intégrale**

Présentation d'un algorithme associé à la méthode des trapèzes. Intérêt d'utiliser des subdivisions dichotomiques.

On admettra que pour une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ , l'erreur est un  $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$  où  $n$  est le nombre de points de subdivision.

**c) Valeur approchée de réels**

On présentera, sur des exemples, quelques algorithmes de calcul de nombres réels remarquables ( $\pi$ ,  $e$ ,  $\sqrt{2}$ , etc.).

On pourra utiliser les algorithmes vus précédemment.

**III. NOTIONS SUR LES FONCTIONS DE DEUX VARIABLES RÉELLES**

*Cette partie constitue une première prise de contact avec les fonctions de plusieurs variables ; toute technicité est à éviter aussi bien pour la présentation du cours qu'au niveau des exercices et problèmes.*

*L'objectif, très modeste, est triple :*

- *étudier quelques notions de base sur les fonctions de deux variables réelles (continuité et dérivation) ;*
- *introduire la notion d'intégrale double ;*
- *exploiter les résultats obtenus pour l'étude de problèmes, issus notamment des autres disciplines scientifiques.*

*En vue de l'enseignement de ces disciplines, il convient d'étendre brièvement ces notions aux fonctions de trois variables réelles. Mais, en mathématiques, les seules connaissances exigibles des étudiants ne portent que sur les fonctions de deux variables.*

*Les suites d'éléments de  $\mathbf{R}^2$  et les fonctions d'une variable réelle à valeurs dans  $\mathbf{R}^2$  ont déjà été étudiées en se ramenant aux suites et fonctions à valeurs réelles par passage aux coordonnées (cf. I.1-f) et I.2-e).*

**1- Calcul différentiel**

*Les fonctions considérées dans ce chapitre sont définies sur une partie  $A$  de  $\mathbf{R}^2$  qui est muni de la norme euclidienne usuelle ; l'étude générale des normes sur  $\mathbf{R}^2$  est hors programme. Pour la pratique, on se limite aux cas où  $A$  est définie par des conditions simples.*

**a) Notion de continuité**

Définition de la limite 0 en un point.

Continuité en un point.

La continuité est introduite uniquement en vue de l'étude de la classe  $\mathcal{C}^1$ . Tous les résultats seront admis et on insistera sur l'interprétation graphique.

**b) Dérivées partielles premières**

Définition des dérivées partielles, notées  $D_j f(a)$  ou  $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ .

Définition du gradient.

Définition des fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A$  (les dérivées partielles sont continues).

Calcul de la dérivée d'une fonction composée de la forme  $f \circ \varphi$ , où  $\varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un intervalle  $I$  et à valeurs dans  $A$ .

Application au calcul des dérivées partielles d'une fonction composée de la forme  $f \circ \varphi$ , où  $\varphi$  est une application de classe  $\mathcal{C}^1$  de  $\mathbf{R}^2$  et à valeurs dans  $\mathbf{R}^2$ .

En un point de  $\mathbf{R}^2$  où une fonction  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbf{R}^2$  présente un extremum local, ses dérivées partielles sont nulles.

En vue de l'enseignement des autres disciplines scientifiques, il convient de donner la notation différentielle  $df$ , mais aucune connaissance sur ce point n'est exigible en mathématiques.

**c) Dérivées partielles d'ordre 2**

Théorème de Schwarz.

La démonstration est hors programme.

Exemples simples d'équations aux dérivées partielles, équation des cordes vibrantes.

## 2- Calcul intégral

Intégrales doubles sur une partie bornée définie par des conditions simples.

Exemples de calculs par intégrations successives.

Exemples de calcul d'aires planes, de masses, de centres et de moment d'inertie

Les propriétés de positivité, linéarité, additivité par rapport au domaine d'intégration doivent être énoncées sans démonstration.

# ALGÈBRE

*Le programme d'algèbre est organisé autour des concepts fondamentaux d'espace vectoriel et d'application linéaire, et de leurs interventions en algèbre, en analyse et en géométrie. La maîtrise de l'algèbre linéaire élémentaire en dimension finie constitue un objectif essentiel.*

*Le cadre d'étude est bien délimité : brève mise en place des concepts d'espace vectoriel, d'application linéaire, de sous-espaces vectoriels supplémentaires ; en dimension finie, étude des concepts de base, de dimension et de rang, mise en place du calcul matriciel.*

*La maîtrise de l'articulation entre le point de vue géométrique (vecteurs et points) et le point de vue matriciel constitue un objectif majeur.*

*Pour les groupes, le programme se limite à quelques définitions de base et aux exemples usuels ; toute étude générale de cette structure est hors programme.*

*Le point de vue algorithmique est à prendre en compte pour l'ensemble de ce programme.*

## I. NOMBRES ET STRUCTURES ALGÈBRIQUES USUELLES

### 1- Vocabulaire relatif aux ensembles et aux applications (à acquérir progressivement)

*Le programme se limite strictement aux notions de base figurant ci-dessous. Ces notions doivent être acquises progressivement par les étudiants au cours de l'année, au fur et à mesure des exemples rencontrés dans les différents chapitres d'algèbre, d'analyse et de géométrie. Elles ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une étude exhaustive bloquée.*

Ensembles, appartenance, inclusion. Ensemble  $\mathcal{P}(E)$  des parties de  $E$ . Opérations sur les parties : intersection, réunion, complémentaire. Produit de deux ensembles.

Application de  $E$  dans (vers)  $F$ . Image directe (resp. réciproque) d'une partie de  $E$  (resp. de  $F$ ).

Ensemble  $\mathcal{F}(E, F)$  des applications de  $E$  dans  $F$ . Ensemble  $E^I$  des familles  $(x_i)_{i \in I}$  d'éléments d'un ensemble  $E$  indexées par un ensemble  $I$ .

Composée de deux applications, application identique. Restriction et prolongements d'une application.

Équations, applications injectives, surjectives, bijectives. Application réciproque d'une bijection. Composée de deux bijections.

Définition d'une loi de composition interne. Associativité, commutativité, élément neutre. Définition des éléments inversibles pour une loi associative admettant un élément neutre.

### 2- Nombres entiers naturels, ensembles finis, dénombrements

*En ce qui concerne les nombres entiers naturels et les ensembles finis, l'objectif principal est d'acquérir la maîtrise du raisonnement par récurrence. Les propriétés de l'addition, de la multiplication et de la relation d'ordre dans  $\mathbf{N}$  sont supposées connues ; toute construction et toute axiomatique de  $\mathbf{N}$  sont hors programme.*

*L'équipotence des ensembles infinis et la notion d'ensemble dénombrable sont hors programme.*

*En ce qui concerne la combinatoire, le programme se limite strictement aux exemples fondamentaux indiqués ci-dessous.*

*La démonstration des résultats de ce chapitre n'est pas exigible des étudiants.*

### a) Nombres entiers naturels

Propriétés fondamentales de l'ensemble  $\mathbf{N}$  des nombres entiers naturels. Toute partie non vide a un plus petit élément ; principe de récurrence. Toute partie majorée non vide a un plus grand élément.

Suites d'éléments d'un ensemble  $E$  (indexées par une partie de  $\mathbf{N}$ ). Suite définie par une relation de récurrence et une condition initiale.

Exemples d'utilisation des notations

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{1 \leq p \leq n} a_p, \quad a_1 a_2 \cdots a_n = \prod_{1 \leq p \leq n} a_p.$$

Suites arithmétiques, géométriques. Notations  $na$  et  $a^n$ .

### b) Ensembles finis

Définition : il existe  $n$  et une bijection de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  sur  $E$  ; cardinal (ou nombre d'éléments) d'un ensemble fini, notation  $\text{Card } E$ . On convient que l'ensemble vide est fini et que  $\text{Card}(\emptyset) = 0$ .

Toute partie  $E'$  d'un ensemble fini  $E$  est finie et

$$\text{Card } E' \leq \text{Card } E,$$

avec égalité si et seulement si  $E' = E$ .

### c) Opérations sur les ensembles finis, dénombrements

Si  $E$  et  $F$  sont des ensembles finis,  $E \cup F$  l'est aussi ; cardinal d'une réunion finie de parties finies disjointes.

Si  $E$  et  $F$  sont des ensembles finis,  $E \times F$  l'est aussi et

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card } E \cdot \text{Card } F.$$

Cardinal de l'ensemble  $\mathcal{F}(E, F)$  des applications de  $E$  dans  $F$  ; cardinal de l'ensemble  $\mathcal{P}(E)$  des parties de  $E$ . Cardinal de l'ensemble des bijections (permutations) de  $E$ .

Cardinal  $\binom{n}{p}$  de l'ensemble des parties ayant  $p$  éléments d'un ensemble  $E$  à  $n$  éléments. Combinaisons.

Relations

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}, \quad \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n,$$

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1} \text{ (triangle de Pascal).}$$

Interprétation ensembliste de ces relations

Ensemble  $\mathbf{Z}$  des nombres entiers, ensemble  $\mathbf{Q}$  des nombres rationnels. Relation d'ordre, valeur absolue.

Les étudiants doivent maîtriser le raisonnement par récurrence simple ou avec prédécesseurs.

Symbole  $n!$  (on convient que  $0! = 1$ ).

On admet que s'il existe une bijection de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  sur  $\llbracket 1, n \rrbracket$ , alors  $p = n$ .

Étant donnés deux ensembles finis  $E$  et  $F$  de même cardinal, et une application  $f$  de  $E$  dans  $F$ ,  $f$  est bijective si et seulement si  $f$  est surjective ou injective.

Une partie non vide  $P$  de  $\mathbf{N}$  est finie si et seulement si elle est majorée. Si  $P$  est finie non vide, il existe une bijection strictement croissante et une seule de l'intervalle  $\llbracket 1, n \rrbracket$  sur  $P$ , où  $n = \text{Card } P$ .

Les étudiants doivent connaître la relation  $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B)$ .

Les constructions de  $\mathbf{Z}$  et de  $\mathbf{Q}$  sont hors programme.

### 3- Ensembles de nombres

Pour la notion de groupe, le programme se limite strictement aux définitions indiquées ci-dessous. Ces notions doivent être acquises progressivement par les étudiants au cours de l'année, au fur et à mesure des exemples rencontrés dans les différents chapitres d'algèbre, d'analyse et de géométrie.

#### a) Vocabulaire relatif aux groupes et aux ensembles de nombres

Définition d'un groupe, d'un sous-groupe, d'un morphisme de groupes, d'un isomorphisme.

Groupe additif  $\mathbf{Z}$  des nombres entiers. Multiplication dans  $\mathbf{Z}$ , propriétés.

Ensemble  $\mathbf{Q}$  des nombres rationnels, opérations.

Ces notions doivent être illustrées par des exemples issus :

- des ensembles de nombres, notamment  $\mathbf{Z}$ ,  $\mathbf{R}$  et  $\mathbf{C}$  ;

- de l'algèbre linéaire et de la géométrie.

#### b) Arithmétique dans $\mathbf{Z}$ . Calculs dans $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$ .

Multiplés et diviseurs d'un entier, division euclidienne.

Définition des nombres premiers. Existence et unicité de la décomposition d'un entier strictement positif en produit de facteurs premiers.

Formule du binôme. Relation

$$x^n - y^n = (x - y) \sum_{k=0}^{n-1} x^{n-k-1} y^k.$$

Somme des  $n$  premiers termes d'une suite géométrique.

La démonstration de l'existence et de l'unicité de la décomposition en facteurs premiers est hors programme.

On généralisera en cours d'année au cas d'éléments qui commutent dans les anneaux de matrices ou d'endomorphismes.

### 4- Polynômes

L'objectif est d'étudier, par des méthodes élémentaires, les propriétés de base des polynômes, et de les exploiter pour la résolution de problèmes portant sur les équations algébriques et les fonctions numériques.

Le programme se limite au cas où le corps de base est  $\mathbf{K}$ , où  $\mathbf{K}$  désigne  $\mathbf{R}$  ou  $\mathbf{C}$ .

#### a) Polynômes à une indéterminée

Ensemble  $\mathbf{K}[X]$  des polynômes à une indéterminée à coefficients dans  $\mathbf{K}$  ; opérations.

Degré d'un polynôme (on convient que le degré de 0 est  $-\infty$ ), coefficient dominant, polynôme unitaire (ou normalisé). Degré d'un produit, d'une somme ; les polynômes de degré inférieur ou égal à  $p$  constituent un sous-espace vectoriel de  $\mathbf{K}[X]$ .

Multiplés et diviseurs d'un polynôme, polynômes associés. Division euclidienne dans  $\mathbf{K}[X]$ , algorithme de la division euclidienne.

#### b) Fonctions polynomiales

Fonction polynomiale associée à un polynôme. Équations algébriques. Zéros (ou racines) d'un polynôme ; ordre de multiplicité. Isomorphisme entre polynômes et fonctions polynomiales.

Aucune connaissance sur la construction de  $\mathbf{K}[X]$  n'est exigible des étudiants.

Notation  $a_0 + a_1 X + \dots + a_p X^p$  ou, le cas échéant,  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$ .

Les notions de PGCD, de PPCM et de polynômes premiers entre eux sont hors programme.

Reste de la division euclidienne d'un polynôme  $P$  par  $X - a$  ; caractérisation des zéros de  $P$ .

#### c) Polynôme dérivé

Définition du polynôme dérivé. Linéarité de la dérivation, dérivée d'un produit. Dérivées successives, dérivée  $n$ -ième d'un produit (formule de Leibniz).

Caractérisation par la valeur des dérivées successives en  $a$  de l'ordre de multiplicité de la racine  $a$ .

Démonstration non exigible.

**d) Polynômes scindés**

Définition d'un polynôme scindé sur  $\mathbf{K}$  ; somme et produit des racines d'un polynôme scindé.

Théorème de d'Alembert-Gauss. Description des polynômes irréductibles de  $\mathbf{C}[X]$  et de  $\mathbf{R}[X]$ .

Décomposition d'un polynôme en produit de facteurs irréductibles sur  $\mathbf{C}$  et sur  $\mathbf{R}$ .

Aucune connaissance spécifique sur le calcul des fonctions symétriques des racines d'un polynôme n'est exigible des étudiants.

La démonstration du théorème de d'Alembert-Gauss est hors programme.

Décomposition dans  $\mathbf{C}[X]$  de  $X^n - 1$ .

**II. ALGÈBRE LINÉAIRE**

*L'objectif est double :*

- acquérir les notions de base sur les espaces vectoriels de dimension finie (indépendance linéaire, bases, dimension, sous-espaces vectoriels supplémentaires et projecteurs, rang), le calcul matriciel et la géométrie du plan et de l'espace (droites et plans) ;

- maîtriser les relations entre le point de vue géométrique (vecteurs et applications linéaires) et le point de vue matriciel.

*Il convient dans l'étude de l'algèbre linéaire de réinvestir la géométrie du plan et de l'espace étudiée en début d'année et d'illustrer les notions et les résultats par de nombreuses figures.*

*En algèbre linéaire, le programme se limite au cas où le corps de base est  $\mathbf{K}$ , où  $\mathbf{K}$  désigne  $\mathbf{R}$  ou  $\mathbf{C}$ .*

**1- Espaces vectoriels****a) Espaces vectoriels**

Définition d'un espace vectoriel sur  $\mathbf{K}$ , d'un sous-espace vectoriel.

Intersection de sous-espaces vectoriels. Sous-espace engendré par une famille finie de vecteurs.

Somme de deux sous-espaces vectoriels. Sous-espaces supplémentaires, notation

$$E = E_1 \oplus E_2.$$

Espace vectoriel  $\mathcal{F}(X, F)$  des applications d'un ensemble  $X$  dans un espace vectoriel  $F$ .

Exemples : espace  $\mathbf{K}^n$ , espaces vectoriels de suites ou de fonctions.

La notion générale de somme directe est hors programme.

**b) Applications linéaires**

Définition d'une application linéaire, d'une forme linéaire, d'un endomorphisme.

Espace vectoriel  $\mathcal{L}(E, F)$  des applications linéaires de  $E$  dans  $F$ .

Composée de deux applications linéaires, réciproque d'une application linéaire bijective. Définition d'un isomorphisme, d'un automorphisme. Définition du groupe linéaire  $GL(E)$ .

Équations linéaires ; noyau et image d'une application linéaire. Ensemble des solutions de  $u(x) = b$ .

Caractérisation des projecteurs par la relation  $p^2 = p$ .  
Caractérisation des symétries par la relation  $s^2 = I_E$ .

Homothéties. Projecteurs et symétries associés à deux sous-espaces supplémentaires.

Exemples d'applications linéaires en analyse, en géométrie.

L'étude générale du groupe linéaire est hors programme.

Description de l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire.

**2- Dimension des espaces vectoriels****a) Familles de vecteurs**

Définition des combinaisons linéaires de  $p$  vecteurs  $x_1, x_2, \dots, x_p$  d'un espace vectoriel ; image par une application linéaire d'une combinaison linéaire.

Le cas des familles indexées par un ensemble infini est hors programme.

Sous-espace engendré par une famille finie de vecteurs.

Définition d'une famille génératrice.

Indépendance linéaire : définition d'une famille libre, liée.

Définition d'une base ; coordonnées (ou composantes) d'un vecteur dans une base. Base canonique de  $\mathbf{K}^n$ .

Étant donné un espace vectoriel  $E$  muni d'une base  $(e_1, \dots, e_p)$  et une famille  $(f_1, \dots, f_p)$  de vecteurs d'un espace vectoriel  $F$ , il existe une application linéaire  $u$  et une seule de  $E$  dans  $F$  telle que  $u(e_j) = f_j$ .

## b) Dimension d'un espace vectoriel

Définition d'un espace vectoriel de dimension finie (espace vectoriel admettant une famille génératrice finie). Théorème de la base incomplète, existence de bases.

Toutes les bases d'un espace vectoriel  $E$  de dimension finie sont finies et ont le même nombre d'éléments, appelé dimension de  $E$ . On convient que l'espace vectoriel réduit à  $\{0\}$  est de dimension nulle.

Tout espace vectoriel de dimension  $n$  est isomorphe à  $\mathbf{K}^n$  ; deux espaces vectoriels de dimension finie  $E$  et  $F$  sont isomorphes si et seulement si  $\dim E = \dim F$ .

Étant donné un espace vectoriel  $E$  muni d'une base  $B = (e_j)$  et un espace vectoriel  $F$  muni d'une base  $C = (f_i)$ , une application linéaire  $u$  de  $E$  dans  $F$  et un vecteur  $x$  de  $E$ , expression des coordonnées de  $y = u(x)$  dans  $C$  en fonction des coordonnées de  $x$  dans  $B$ .

## c) Dimension d'un sous-espace vectoriel

Tout sous-espace vectoriel  $E'$  d'un espace vectoriel de dimension finie  $E$  est de dimension finie et  $\dim E' \leq \dim E$ , avec égalité si et seulement si  $E' = E$ . Rang d'une famille de vecteurs.

Existence de sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un sous-espace vectoriel donné ; dimension d'un supplémentaire.

## d) Rang d'une application linéaire

Étant donnée une application linéaire  $u$  de  $E$  dans  $F$ ,  $u$  définit un isomorphisme de tout supplémentaire de  $\text{Ker } u$  sur  $\text{Im } u$  ; en particulier,

$$\dim E = \dim \text{Ker } u + \dim \text{Im } u.$$

Rang d'une application linéaire, caractérisation des isomorphismes.

Caractérisation des éléments inversibles de  $\mathcal{L}(E)$ .

La donnée d'une famille de  $p$  vecteurs  $(x_1, x_2, \dots, x_p)$  d'un  $\mathbf{K}$ -espace vectoriel  $E$  détermine une application linéaire de  $\mathbf{K}^p$  dans  $E$  ; noyau et image de cette application ; caractérisation des bases de  $E$ , des familles génératrices, des familles libres.

Étant donnée une famille  $S$  de vecteurs d'un espace vectoriel de dimension  $n$  :

- si  $S$  est libre, alors  $p \leq n$ , avec égalité si et seulement si  $S$  est une base ;
- si  $S$  est génératrice, alors  $p \geq n$ , avec égalité si et seulement si  $S$  est une base.

Étant donnée une forme linéaire  $\varphi$  sur  $E$ , expression de  $\varphi(x)$  en fonction des coordonnées de  $x$  dans  $B$ .

Les étudiants doivent connaître la relation  $\dim(E + F) = \dim E + \dim F - \dim(E \cap F)$ .

Cas d'une forme linéaire : caractérisation et équations d'un hyperplan.

La démonstration de cette relation est hors programme.

## 3- Calcul matriciel

### a) Opérations sur les matrices

Espace vectoriel  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbf{K})$  des matrices à  $n$  lignes et  $p$  colonnes sur  $\mathbf{K}$ . Base canonique  $(E_{i,j})$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbf{K})$  ; dimension de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbf{K})$ . Isomorphisme canonique de  $\mathcal{L}(\mathbf{K}^p, \mathbf{K}^n)$  sur  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbf{K})$ . Définition du produit matriciel, bilinéarité.

Ensemble  $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$  des matrices carrées à  $n$  lignes. Isomorphisme canonique de  $\mathcal{L}(\mathbf{K}^n)$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ . Matrices carrées inversibles ; définition du groupe linéaire  $\text{GL}_n(\mathbf{K})$ .

Transposée d'une matrice. Compatibilité avec les opérations algébriques sur les matrices.

Identification des matrices colonnes et des vecteurs de  $\mathbf{K}^n$ , des matrices lignes et des formes linéaires sur  $\mathbf{K}^p$ .

Écriture matricielle  $Y = M X$  de l'effet d'une application linéaire sur un vecteur.

Matrices diagonales, matrices triangulaires supérieures (ou inférieures).

Matrices carrées symétriques, antisymétriques.

## b) Matrices et applications linéaires

Matrice  $M_{B,C}(u)$  associée à une application linéaire  $u$  d'un espace vectoriel  $E$  muni d'une base  $B$  dans un espace vectoriel  $F$  muni d'une base  $C$ . L'application  $u \mapsto M_{B,C}(u)$  est un isomorphisme de  $\mathcal{L}(E, F)$  sur  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbf{K})$ ; dimension de  $\mathcal{L}(E, F)$ .

Matrice  $M_B(u)$  associée à un endomorphisme  $u$  d'un espace vectoriel  $E$  muni d'une base  $B$ . L'application  $u \mapsto M_B(u)$  est un isomorphisme d'algèbres.

Matrice dans une base d'une famille finie de vecteurs, d'une famille finie de formes linéaires.

Matrice de passage d'une base  $B$  à une base  $B'$  d'un espace vectoriel  $E$ ; effet d'un changement de base(s) sur les coordonnées d'un vecteur, sur l'expression d'une forme linéaire, sur la matrice d'une application linéaire, sur la matrice d'un endomorphisme (les notions de matrices équivalentes, de matrices carrées semblables sont hors programme).

Cas où le changement de base résulte d'une rotation vectorielle en dimension 2 ou 3.

## c) Rang d'une matrice

Définition du rang d'une matrice (rang de l'application linéaire canoniquement associée, ou encore rang des vecteurs colonnes).

Invariance du rang par transposition

## d) Systèmes d'équations linéaires

Définition, système homogène associé; interprétations. Description de l'ensemble des solutions.

Rang d'un système linéaire. Dimension de l'espace vectoriel des solutions d'un système linéaire homogène.

Existence et unicité de la solution lorsque  $r = n = p$  (systèmes de Cramer). Résolution des systèmes de Cramer triangulaires. Exemples d'utilisation de la méthode du pivot de Gauss.

## e) Déterminants d'ordres 2 et 3

Déterminant de deux vecteurs dans une base d'un espace vectoriel de dimension 2, de trois vecteurs dans une base d'un espace vectoriel de dimension 3. Caractérisation des bases.

Application à l'expression de la solution d'un système de Cramer à deux ou trois inconnues.

Déterminant d'un endomorphisme, du composé de deux endomorphismes; caractérisation des automorphismes.

Déterminant d'une matrice carrée. Déterminant du produit de deux matrices.

Les matrices symétriques et les matrices antisymétriques constituent des sous-espaces supplémentaires.

La  $j$ -ème colonne de  $M_{B,C}(u)$  est constituée des coordonnées dans la base  $C$  de l'image par  $u$  du  $j$ -ème vecteur de la base  $B$ .

La matrice de passage de la base  $B$  à la base  $B'$  est, par définition, la matrice de la famille  $B'$  dans la base  $B$ : sa  $j$ -ème colonne est constituée des coordonnées dans la base  $B$  du  $j$ -ème vecteur de la base  $B'$ . Cette matrice est aussi  $M_{B',B}(I_E)$ .

Pour toute application linéaire  $u$  de  $E$  dans  $F$ , le rang de  $u$  est égal au rang de  $M_{B,C}(u)$ , où  $B$  est une base de  $E$  et  $C$  une base de  $F$ .

Démonstration hors programme

Les étudiants doivent connaître l'interprétation d'un système de  $n$  équations linéaires à  $p$  inconnues, à l'aide des vecteurs de  $\mathbf{K}^n$ , des formes linéaires sur  $\mathbf{K}^p$ , et d'une application linéaire de  $\mathbf{K}^p$  dans  $\mathbf{K}^n$  (ainsi que la traduction matricielle correspondante).

Le théorème de Rouché-Fontené et les matrices bordantes sont hors programme.

On traitera le cas de la dimension 2; la démonstration en dimension 3 sera faite en seconde année. Les principaux objectifs sont l'étude de l'indépendance linéaire et de petits systèmes de Cramer, et les applications géométriques.

Lorsque  $\mathbf{K} = \mathbf{R}$ , application à l'orientation du plan, de l'espace; la donnée d'une base détermine une orientation. Bases directes du plan ou de l'espace orienté. Produit vectoriel de deux vecteurs de  $\mathbf{R}^3$ .

Calcul du déterminant d'une matrice par développement selon les éléments d'une rangée.